

## ŚWIADOMA ZGODA NA REKTOSIGMOIDOSKOPIĘ INFORMACJA DLA PACJENTA

**Poniższa informacja ma na celu udzielenie odpowiedzi na ewentualne pytania pacjentów dotyczące rektosigmoidoskopii. Wszelkie inne pytania należy kierować do lekarza lub pielęgniarki bezpośrednio przed zabiegiem**

### Co to jest rektosigmoidoskopia?

Rektosigmoidoskopia jest badaniem umożliwiającym obejrzenie końcowego odcinka jelita grubego (odbytnica, esica - odcinek 20 do 30 cm jelita) od środka za pomocą małej kamery umieszczonej na końcu długiego, elastycznego przewodu - kolonoskopu wprowadzanego przez odbyt. Rektosigmoidoskopia jest badaniem technicznie zbliżonym do kolonoskopii, jednak zasięg zbadanego jelita jest znacznie krótszy.


### Wskazania do rektosigmoidoskopii

Głównym wskazaniem jest diagnostyka krwawienia z odbytu, a ponadto występowanie ołówkowatych (cienkich) stolców, uczucia niepełnego wypróżnienia, bólu w trakcie defekacji. Po wykonaniu rektosigmoidoskopii lekarz może zalecić ocenę całego jelita grubego czyli wykonanie kolonoskopii.

### Przebieg badania

Przed badaniem pacjent przebiera się w jednorazowe ubranie medyczne i układa się na lewym boku. Następnie lekarz ogląda okolice odbytu, smaruje ją żelem znieczulającym i wprowadza palec do odbytu, aby sprawdzić stopień przygotowania jelita do badania. Potem lekarz wprowadza do odbytnicy posmarowany żelem kolonoskop i stopniowo przesuwa go do esicy, czyli na ok 20-30 cm. W trakcie wprowadzania instrumentu wdmuchuje się do środka niewielką ilość powietrza, co może być przyczyną dolegliwości podobnych do parcia na stolec. Jeżeli uwidocznione zostaną jakieś zmiany chorobowe, to możliwe jest wówczas pobranie wycinków do badania histopatologicznego. Badanie trwa od 3 do 10 minut w zależności od wskazań i ewentualnych dodatkowych czynności, które w trakcie badania trzeba wykonać. Powikłania zdarzają się rzadko i najczęściej polegają na przejściowym krwawieniu związanym z pobraniem wycinków.

Badanie wymaga pisemnej zgody pacjenta



### Jak się przygotować do rektosigmoidoskopii?

- na dwa dni przed badaniem należy stosować dietę z dużą ilością płynów, około 3 litry na dobę,
- w dniu badania wykonać dwukrotnie lewatywę (kupić w aptece); pierwszą ok godzinę przed wyznaczoną godziną badania i drugą około 30 minut przed badaniem.

**Stwierdzam, że przedstawiłem pacjentowi/pacjentce planowany sposób badania oraz poinformowałem o możliwych powikłaniach, które mogą wystąpić w przebiegu lub w wyniku badania.**

podpis i pieczęć lekarza

Słupsk, dnia .....

.....

## Świadoma zgoda pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego na rektosigmoidoskopię

Nazwisko i Imię.....

PESEL.....

### Oświadczenie pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego:

- Zapoznałem/am się ze szczegółowym opisem rektosigmoidoskopii, jej celowością i oczekiwanym wynikiem oraz potencjalnymi zagrożeniami mogącymi wystąpić w wyniku badania endoskopowego.
- Uzyskałem/am wyczerpujące odpowiedzi na wszystkie pytania i wyrażam zgodę na proponowane badanie diagnostyczne.
- Wyrażam zgodę na ewentualne zmodyfikowanie przebiegu badania zgodnie z aktualną wiedzą medyczną – (proszę zaznaczyć właściwe):
  - pobranie wycinków ze śluzówki jelita do badania hist-pat
  - usunięcie polipów – polipektomia
- **W PRZYPADKU BADANIA PRYWATNEGO** – oświadczam, że zostałem poinformowany o kosztach wymienionych powyżej dodatkowych usług i zobowiązuję się pokryć ich koszt zgodnie z aktualnym cennikiem Centrum Zdrowia SALUS.

Aby ograniczyć do minimum ryzyko krwawienia i perforacji ściany przewodu pokarmowego prosimy o odpowiedź na następujące pytania:

1. Czy istnieje u Pani/Pana zwiększona skłonność do krwawienia, zwłaszcza po drobnych skaleczeniach, łatwe powstawanie siniaków?  
 TAK       NIE
2. Czy przyjmuje Pani/Pan leki wpływające na krzepliwość krwi? (np. Acard, Xarelto, Pradaxa, Eliquis, Warfin, Acenokumarol)  
 TAK       NIE
3. Czy ma Pani/Pan dodatkowe pytania związane z planowanym badaniem?  
 TAK       NIE

Data ..... podpis pacjenta/przedstawiciela ustawowego .....

### Zgoda pacjenta na sedację do rektosigmoidoskopii

Sedacja polega na dożylnym podaniu leku uspokajającego (sedatywnego) którego działanie polega na zmniejszeniu napięcia oraz niepokoju, może również powodować senność.

Wyrażam zgodę na podanie sedacji do wykonania rektosigmoidoskopii. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przebiegu sedacji i możliwych powikłaniach. Decyzję o podaniu leków podejmuję samodzielnie i świadomie.

Data ..... podpis pacjenta/przedstawiciela ustawowego .....